Notre concept de tarissements

Séance d'information du 10 novembre 2017

Matinée des éleveurs SOVET Vétérinaires

Les objectifs

- Un emploi raisonné des tarisseurs !
  - Problème d'exploitation?
    - Nombre cellules théorique dans le lait de tank
    - Nombre de mammites cliniques par an
    - Nombre de vaches avec des cellules >150'000/ml
    - Pourcentage de pertes par année pour raisons de santé mammaires

Les principes

- Pour quelle vache ?
  - Historique et antécédants
  - Niveau de production
- Quels germes ?
  - Importance des analyses bactériologiques!
- Exploitations BioSuisse
  - Analyse de lait et antibiogramme obligatoires avant tarissement aux antibiotiques

Notre proposition

- Journal de tarissement
  - A portée de main
  - Remplir avec l'identification de l'animal
    - Nom ou numéro à 4 chiffres!
  - Les raisons du tarissement

- A télécharger depuis notre site internet

  www.sovet.ch sous la rubrique « liens »

Journal de tarissement

Concept de tarissement pour vaches laitières.

Orbeseal: Obturateur sans antibiotiques, pas de délai d'attente. Lire la notice d'emploi!
Orbenin extra dry: Protection avec antibiotiques. Délai d'attente lait et viande: 7 semaines = 49 jours.
Super Mastitar: Protection avec antibiotiques. Délai d'attente viande: 28 Tage, Lait 35 jours + 5 traites.
Pour tous les tarisseurs: en cas d'abattage durant la période sèche: la viande doit être analysée.

Animal	**Tarissement**				
Nom / Nr.	Méthode	Raison pour antibiotique (1 -6))	Date	Délai d'attente (jours)	Reprise de livraison
	☐ Orbeseal ☐ Orbenin ☐ Super Mastitar ☐ Pas de tarisseurs ☐ Autres	☐ **1.** Test de Schalm positif ☐ **2.** Comptage cell > 150´000 ☐ **3.** Bactériologie positive ☐ **4.** Maladie mamelle ☐ **5.** Blessure trayon / tétine ☐ **6.** Assainissement S.A		Lait : Viande :	Lait : Viande :

Attention le tarissement avec antibiotiques n'est permis que si l'un des points suivants est positif

1. Test de schalm positif
2. Comptage cellulaire>150'000 sur les 3 derniers contrôles
3. Ex bactériologique positif au tarissement
4. Maladie de la mamelle durant la lactation
5. Blessure du trayon ou de la tétine
6. Assainissement Staph doré

Notre proposition

1. Test de schalm
   - Positif 2 croix, ou une différence entre les quartiers d'une croix et plus
   - Ne pas oublier de palper la tétine!

   🧪Analyse bactériologique en cas de doute

2. Résultats du contrôle laitier:
   - Comptage cellulaire > 150'000/ml en moyenne sur les 3 derniers contrôles

   🧪Test de schalm et analyse bactériologique en cas de doute

3. Examen bactériologique positif
   - Durant la lactation
   - Au tarissement

Notre proposition

4. Maladie de la mamelle durant la lactation
   - 🧪Test de schalm et analyse bactériologique en cas de doute

5. Blessure à la mamelle et/ou au trayon
   - 🧪Test de schalm et analyse bactériologique en cas de doute

6. Assainissement en cours
   - Par ex: staphylocoques dorés GTB+ (contagieux)

Mesures annexes

- Diminution de la pression infectieuse
  - Place
  - Hygiène de la couche
  - Vaches taries ensemble

- Augmentation des défenses immunitaires des animaux
  - Eviter les situations de stress et de surpopulation
  - Alimentation adaptée
  - Minéraux et vitamines adaptés
  - Bonne conformation des trayons

Conclusion

Tarir est un phénomène complexe… et la clé d'un tarissement réussi ne se base pas uniquement sur l'emploi, ou non, d'antibiotiques!